

1 1 変数関数(函数)の微分

この節と次の節の内容は完全に理解する事を要求はしない。しかし、微積分を理論的に支えていく基礎に「実数論・極限論」がある事は理解しておいてほしい。

1.1 実数の基本性質

$0.\dot{9} = 1$ という例などでもわかるように実数をきちんと捉らえる事は中々難しい。どこかに「無限」というものが顔を出す。数学でも実数の概念が「数学的に」明確になったのは(古代ギリシアは除いて)19世紀の半ば以降の事である。

以下は $0.\dot{9} = 1$ を納得してもらうための議論。最初はお話し。 $1 \div 3 = 0.\dot{3}$ だが、 $(1 \div 3) \times 3 = 1$ より $0.\dot{9} = 1$ が分かる。

実数が在った時その無限小数表示というものが考えられる。例えば $\alpha = \sqrt{2}$ という実数が与えられると $1.41421356\dots$ というような表示が考えられる。実際的には小数点以下すべての数を具体的に決定する事は難しいかもしれないが、表示を考える事はできる。ここで逆を考えてみよう。「無限小数は必ず一つの実数を表すのか?」という疑問である。

今この事実を認める事にして最初に例として挙げた $0.\dot{9}$ を考えてみよう。今これは無限小数であるから或る実数を表している。これを α とおく事にしよう。 α が 1 以下である事は認めてよいであろう。さて α が 1 より小さいとしてみる。この時 $0.9, 0.99, 0.999, \dots$ と考えていくといつかは α を越える。つまり、 $1 - \alpha > \frac{1}{10^n}$ とすると $\alpha < \underbrace{0.9\dots9}_{n\text{ 個}} < 0.\dot{9} = \alpha$ なので矛盾。よって $\alpha = 1$ 。

この議論は「無限小数とは何か」ということをきちんと定義していないので「数学的」とは言えないが感じはつかめるかもしれない。この事をきちんと定義すれば実数の連続性を定義できる。しかし通常は別の公理を採用して議論する。

講義で実数を扱う時色々なやり方が有る。実数の基本性質の講義での取り上げ方を幾つか上げると、

- (1) 厳密・厳密—自然数 → 整数 → 有理数と構成し、有理数から実数を作っていく。そして、「この作ったものはこれこれの性質をもつ。」として、基本性質を証明する。
- (2) 基本性質は成立するものと認める。あとはきちんと証明していく。
- (3) 基本性質は成立するものと認める。あとあまりきちんと証明しない。
- (4) そういう問題にはふれない(さわらぬ神にたたりなし)。

などが考えられる。高校までは最後の立場であった。この講義では最後から 2 番目の立場でやることにする。実数—「無限概念」を捉えようとした人間の営みの一端を理解してくれたらと思う。

実数の基本的性質に関してまとめておこう。

(1) 演算

1) 和 … $a + b$ が定義されている

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$ (結合法則)。
2. 0 という実数が存在して、すべての実数 a に対し $a + 0 = 0 + a = a$ (零の存在)。
3. 各実数 a に対し $a + a' = a' + a = 0$ となる実数 a' が存在する。この a' を $-a$ と書く (加法の逆元の存在)。
4. $a + b = b + a$ (交換法則)。

2) 積 … $a \cdot b$ が定義されている。

1. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (結合法則)。
2. 1 という実数が存在して、すべての実数 a に対し $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ (単位元の存在)。
3. 各実数 $a (\neq 0)$ に対し $a \cdot a'' = a'' \cdot a = 1$ となる実数 a'' が存在する。この a'' を $1/a$ と書く (乗法の逆元の存在)。
4. $a \cdot b = b \cdot a$ (交換法則)。

3) 分配法則

1. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

(2) 順序

1) 順序

1. 任意の実数 a, b に対し $a \leq b$ または $b \leq a$ が成立する。
2. $a \leq a$ 。
3. $a \leq b, b \leq c$ ならば $a \leq c$ 。
4. $a \leq b, b \leq a$ ならば $a = b$ 。

2) 和・積

1. $a \leq b$ ならば $a + c \leq b + c$ 。
2. $a \geq 0, b \geq 0$ ならば $a \cdot b \geq 0$ 。

(3) 連続性 … この性質が有理数と実数を区別するものになっている。色々な人が別々に実数の基礎付けを試みたので幾つか違った定義が有る。ここでは定義なしに同値な公理をあげておく。

- 任意の無限小数表示に対しそれで表現される実数が存在する。
- 空集合でない上に有界な実数の部分集合は最小上界 (上限) を持つ (ワイエルシュトラスの公理)。
- 閉区間 $I_n = [a_n, b_n] (n = 1, \dots)$ がすべての n に対し $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$ を満たすとき, $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$ である (カントールの公理)。
- 実数全体を空でない2つの部分集合 A, B に分け, A の任意の元は B の任意の元より小さいとき, A に最大元があるか B に最小元があるかのいずれかが起こる (デデキントの公理)。

Weierstrass の公理で使われている用語の定義をきちんとしておこう。

定義 1.1 実数 \mathbf{R} の部分集合 A が上に有界であるとはある実数 α が存在して A の任意の元 $a \in A$ に対して $a \leq \alpha$ が成立する事をいう。この時 α を A の上界という。

上界は存在する時は沢山在るがこの中で最小なものが在ればそれを最小上界(上限)といい、 $\sup A$ と表す。

Weierstrass の公理は前にも述べたが、空でない有界な集合には上限が存在する事を主張している。例を幾つか見よう。

例 1.2 (1) $A = \{2 - \frac{1}{n^2} | n \in \mathbf{N}\}$ は上に有界で $\sup A = 2$ 。

(2) $A = \{x \in \mathbf{R} | 0 < x, x^2 < 2\}$ は上に有界。上限については別に時に述べる(実は $\sup A = \sqrt{2}$ になる)。

(3) \mathbf{N} は上に有界でない。

「実数の連続性」から無限小数に対応して実数が存在する事を例で見てみよう。例は $0.\dot{9}$ にする。 $a_1 = 0.9, a_2 = 0.99, \dots$ とする。つまり $a_n = \underbrace{0.9 \cdots 9}_{n \text{ 個}}$ とおく。 $A = \{a_n | n \in \mathbf{N}\}$ とすると A は上に有界である。

$\alpha = \sup A$ とおく。これが $0.\dot{9}$ に対応する実数と考える事ができる。存在している α はどの様な数であろう。実数 1 と比較すると (1) $\alpha > 1$, (2) $\alpha = 1$, (3) $\alpha < 1$ の 3 つの場合のどれかだが (1), (3) のときは矛盾するので(証明は各自考えよ) (2) であり、 $\alpha = 1$ である。即ち $0.\dot{9} = 1$ である。

例 1.2 の (2) の最小上界が $\sqrt{2}$ になる事を示そう。これより 2 の平方根は存在する事が分る。一般に正の数の平方根の存在は中間値の定理等で示す事ができるが、ここでは直接「実数の連続性」から導いてみよう。 $A = \{x \in \mathbf{R} | x > 0, x^2 < 2\}$ とおくと、 $1 \in A$ より $A \neq \emptyset$ 。 $x \in A$ を A の元とすると $x^2 < 2 < 4 = 2^2$ 。 $x > 0$ より $x < 2$ が分り 2 は A の上界。よって、 A は上に有界。「実数の連続性」(Weierstrass の公理) より最小上界が存在する。それを $a = \sup A$ とおく。 $a^2 = 2$ を背理法で示す。 $a \geq 0$ に注意して $b = \frac{2a+2}{a+2}$ とおくと、 $b > 0$ で、次式成立。

$$\begin{aligned} b^2 - 2 &= 2(a^2 - 2)/(a+2)^2 \\ b - a &= (2 - a^2)/(a+2) \end{aligned}$$

a) $a^2 < 2$ と仮定する。この時、 $b^2 - 2 < 0$ なので、 $b \in A$ 。ところが、 $b > a$ なので、 a が上界ということに矛盾。

b) $a^2 > 2$ と仮定する。 $b^2 > 2$ なので、 b は A の上界。ところが、 $b < a$ なので、 a が最小の上界である事に矛盾。

1.2 極限概念

まず「数列の極限」について考える。高校時代は『 n が限りなく大きくなる時、 a_n は限りなく A に近づく。』とき、数列 a_n は A に収束するといい、この A を極限値と呼んでいた。しかしこの直観的定義はよく考えると分らない。この定義が数学的に明確なものならその対偶をとっても同値なはずである。同値な命題は『 a_n が限りなく A に近づかない時、 n は限りなく大きくならない。』となるがこれは明確であろうか。イントロでも触れたが微積分は始った時にはその理論的基礎付けは十分明確ではなかった。この極限概念に関しても特に 18 世紀には混乱が起った。1 例として $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ という級数を考えてみよう。幾つかの考え方を紹介しよう。

(1) $\alpha = (1 - 1) + (1 - 1) + \dots$ より、 $\alpha = 0$

(2) $\alpha = 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots$ より、 $\alpha = 1$

(3) $\alpha = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \dots) = 1 - \alpha$ より、 $\alpha = 1/2$

以上の議論により， $0 = 1 = 1/2$

この様ななかで極限概念を明確にしたのはコーシー (Cauchy) であった。彼は概ね以下の様に考えた。『限りなく近づく』という概念は『距離を幾らでも小さくできる』事，もう少し数学的にはつきりさせると『与えられたどんな正の数より距離を小さくできる』事と考えた。

そして『限りなく大きくなる』という概念は『 n をいくらでも大きくする』事，もう少し数学的にはつきりさせると『或る大きな自然数よりも大きくする』事と考えた。

定義 1.3 以上から数列 a_n が A に収束するとは

任意の正の実数 ε に対しある自然数 N が存在して N より大きい任意の自然数 n に対し $|a_n - A| < \varepsilon$ が成立する。

とコーシーは定義した。我々も厳密に取り扱う時にはこれを採用する。このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad \text{または}$$
$$a_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty)$$

と表す。

言い方を変えると次の様にも言える。“任意の正数 ε に対して a_n と A との距離が ε 以上である n は有限個しかない。”

次の定理は当たり前に見えるかもしれないが極限の定義を厳密にする事なしに「証明」できなかつたということは注意する必要がある。

定理 1.4 (極限の性質) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ とする。

(1) 和・定数倍・積・商の極限

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha a_n = \alpha A$
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
- 4) $B \neq 0$ の時, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$

(2) 不等式 $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$) の時, $A \leq B$

- (3) **はさみうちの定理** $a_n \leq b_n \leq c_n$ ($n = 1, 2, \dots$) の時 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$ であれば $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ も収束して極限値は A 。

数列の収束では次の定理が理論的にも実際的にも重要である。

定理 1.5 有界な単調数列は収束する。

理論的な面でいうとこの定理は「実数の連続性」と同値である。この定理を公理にして「実数の連続性」を証明する事ができる。次のこの定理の実際上の良い点は‘収束するかどうか’という事と‘極限値を求める事’を分けられる点である。

$a_n = a^n$ ($0 \leq a < 1$) の収束を考えて見よう。別の方法でもできるが、ここでは定理 1.5 を使おう。 a_n が単調減少数列である事はすぐ分る。また負にはならないので有界である。よって収束する。極限値を α とすると、 $a_{n+1} = aa_n$ より、 $\alpha = a\alpha$ が分る。 $a \neq 1$ より $\alpha = 0$ を得る。

次に「関数の極限」を考えよう。直観的には“ $f(x)$ において x を限りなく a に近づける時 $f(x)$ は A に限りなく近づく”事だが、これもコーシーによって以下の様に考えられ定義された。『限りなく近づく』という概念は数列の場合と同じ様に『与えられたどんな正の数より距離を小さくできる』事と考えた。

また『限りなく近づける』という概念は『距離を小さくする』事、もう少し数学的にはつきりさせると『距離のある値より小さくする』事と考えた。

定義 1.6 以上から関数 $f(x)$ において x を限りなく a に近づけた時 A に収束するとは

任意の正の実数 ε に対しある正の実数 δ が存在して $0 < |x - a| < \delta$ となる任意の実数 x に対し $|f(x) - A| < \varepsilon$ が成立する。

とコーシーは定義した。我々も厳密に取り扱う時にはこれを採用する。このとき

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= A \quad \text{または} \\ f(x) &\longrightarrow A \quad (x \rightarrow a)\end{aligned}$$

と表す。

$x \rightarrow \infty$ も同様に定義している。

任意の正の実数 ε に対しある実数 L が存在して L より大きい任意の実数 x に対し $|f(x) - A| < \varepsilon$ が成立する。

このとき

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= A \quad \text{または} \\ f(x) &\longrightarrow A \quad (x \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

と表す。

この論法を ε - δ 論法という（安易な命名法だ）。

数列の極限に関する定理 1.4 と同様に関数に対しても次を示す事ができる。

定理 1.7 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ とする時

(1) 和・定数倍・積・商の極限

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$
- 2) $\lim_{x \rightarrow a} \alpha f(x) = \alpha A$
- 3) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$
- 4) $B \neq 0$ の時, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

- (2) 不等式 $f(x) \leq g(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) の時, $A \leq B$
- (3) はさみうちの定理 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) の時 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A$ で
あれば $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ も収束して極限値は A 。

ここでイントロのとき紹介した微積分学に対するバークレーの批判に対し, $\varepsilon - \delta$ 論法の立場で答えておこう。 $y = f(x) = x^2$ の導関数を求める事に対する批判であった。 $A = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{2xh + h^2}{h}$ において h で割算して $A = 2x + h$ としておきながら, $\lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x$ とするのはおかしいとの批判であった。

コーシーの立場からは次の様な議論になる。任意の $\varepsilon > 0$ に対し $\delta > 0$ を適当に見つけなくてはならないが、今 $\delta = \varepsilon$ としよう。このとき $0 < |h| < \delta$ となる任意の h に対し $|A - 2x| = |h| < \delta = \varepsilon$ となるので、定義より $\lim_{h \rightarrow 0} A = 2x$ となる。この立場では $h = 0$ となる事はない。

肩透かしの様な回答に感じるかもしれない。しかし極限における「等号」がきちんと定義されているのがこの議論のよい点であろう。バークレーの議論ではきちんと定義されていない極限における「等号」を通常の「等号」と同じように扱っていた。