

5 多変数関数の積分

積分を多変数に拡張しよう。拡張されるのは不定積分ではなく、定積分である。「積分 = 定積分」であり、不定積分はその計算法であるという事実が、多変数になると 1 变数の場合よりも明確になる。「多変数」という表題であるが、微分法のときと同様に主要には 2 变数関数の場合を扱う。3 变数関数にも少しふれるが、一般的な n 变数関数の場合は扱わない。興味あるものは以前あげたテキストを参考にして欲しい。

5.1 定義と諸性質

定義の前に 1 变数関数の場合を振り返る。1 变数の場合積分とは関数と区間に對しある実数を対応させる写像と考える事ができた：即ち関数 f と区間 $[a, b]$ に対し実数 $J(f; [a, b])$ が存在して次の 4 つの性質を持つ。

(1) [線型性]

- 1) $J(f + g; [a, b]) = J(f; [a, b]) + J(g; [a, b])$
- 2) $J(\alpha f; [a, b]) = \alpha J(f; [a, b])$

(2) [区間線型性]

$$J(f; [a, b]) = J(f; [a, c]) + J(f; [c, b])$$

(3) [単調性] 任意の $x \in [a, b]$ に対し $f(x) \leq g(x)$ となるとき

$$J(f; [a, b]) \leq J(g; [a, b])$$

(4) [単位の値] 値が 1 である定数関数 τ に対し

$$J(\tau; [a, b]) = b - a$$

具体的構成は、分割 $\Delta = \{x_0, \dots, x_n\}$ に対し $s(\Delta) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$, $S(\Delta) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$, $\Sigma(\Delta, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ を $\|\Delta\| \rightarrow 0$ としたときの極限として定義された。

そこで 2 变数関数の積分としては次の様なものを考えたい。2 变数関数 f と R^2 のある領域 D に対し、実数 $J(f; D)$ を対応させる写像で次の 4 つの性質を持つ。

(1) [線型性]

- 1) $J(f + g; D) = J(f; D) + J(g; D)$

このプリントも含め講義関連のプリントは <http://math.cs.kitami-it.ac.jp/~kouno/kougi.html> においてある。

$$2) \ J(\alpha f; D) = \alpha J(f; D)$$

- (2) [領域線型性] 領域 D_1, D_2 に対し $m(D_1 \cap D_2) = 0$ のとき和集合 $C_1 \cup D_2$ を $D_1 + D_2$ と書く。ただし $m(X)$ は領域 X の面積とする。

$$J(f; D_1 + D_2) = J(f; D_1) + J(f; D_2)$$

- (3) [単調性] 任意の $(x, y) \in D$ に対し $f(x, y) \leq g(x, y)$ となるとき

$$J(f; D) \leq J(g; D)$$

- (4) [単位の値] 値が 1 である定数関数 τ に対し

$$J(\tau; D) = m(D)$$

この様な積分 J を定義するため 1 变数の場合と同様に分割を用いて定義する。ただし 2 变数になると領域の形が問題になるので定義は 2 段階で行う。最初は領域が長方形の場合、次に一般的な場合を扱う。




図 5.1

定義域が長方形領域の場合 : $R = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ とする。 R で有界な 2 变数関数 $f(x, y)$ を考える。 R の分割 $\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n; y_0, y_1, \dots, y_m\}$ とは

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$$

となるものとする。 i, j ($i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$) に対し小長方形領域 Δ_{ij} を

$$\Delta_{ij} = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{j-1} \leq y \leq y_j\}$$

で定義する。 Δ_{ij} における上界、下界をそれぞれ M_{ij}, m_{ij} とする。つまり

$$M_{ij} = \sup \{f(x, y) \mid (x, y) \in \Delta_{ij}\} \quad m_{ij} = \inf \{f(x, y) \mid (x, y) \in \Delta_{ij}\}$$

とするとき， $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$ とおき，

$$S(\Delta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j, s(\Delta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta x_i \Delta y_j$$

と定義する。分割の最大幅 $\|\Delta\|$ を $\|\Delta\| = \max \{ \Delta x_i, \Delta y_j \mid i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \}$ で定義する。 $\|\Delta\| \rightarrow 0$ とするとき， $S(\Delta)$, $s(\Delta)$ が同じ極限値に収束するとき， f は R で積分可能 (integrable) であるといい，極限値を

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

で表す。

定義域が一般の場合： D を R^2 の有界閉領域とする。 f を D で定義された有界な関数とする。

D を含む長方形領域 R を 1 つ固定する。このとき $f_R(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$ と定義

する。 f_R が R で積分可能のとき， f は D で積分可能であるといい，

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_R f_R(x, y) dx dy$$

で定義する。

ここで 2 つ注意をしておく。1 つ目はこの定義が矛盾なく定義されているかという点である。 R と異なる長方形領域 R' をとったとき， $\iint_R f_R(x, y) dx dy$ が存在するのに $\iint_{R'} f_{R'}(x, y) dx dy$ が存在しなかつたりすると，積分可能という概念は確定しない。また $\iint_R f_R(x, y) dx dy$ と $\iint_{R'} f_{R'}(x, y) dx dy$ の値が異なると積分値が確定しない。

2 つ目は積分可能性の問題である。 D の形は色々なものが考えられるので，定数関数 τ に対しても $\iint_D \tau(x, y) dx dy$ が存在しないものがある。我々はその様な領域は考えないことにする。積分領域 D といったら， D 上で定数関数は積分可能になる事を仮定する。(この様な領域を面積確定と呼ぶ。) 有限個の滑らかな曲線で囲まれた図形は面積確定である。以下では積分領域は面積確定なものに限ることにする。この仮定の元で次の定理が成り立つ。

定理 5.1 f が D で連続のとき f は D で積分可能である。

1 变数のときと同じ様に Riemann 和を用いても定義できる。つまり小領域 Δ_{ij} から点 (ξ_i, η_j) を任意に選んで来る。このとき

$$\Sigma(\Delta; \{\xi_i\}, \{\eta_j\}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j$$

とおく。分割を細かくしていったとき， ξ_i, η_j の選び方によらず同じ極限値に収束するとき，積分可能と定義すると前の定義と同値であることが分かる。

定義に従って積分を計算してみよう。 $z = f(x, y) = xy$ とし, $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ とするとき

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

を求めよう。

分割 $\Delta_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n; y_0, y_1, \dots, y_n\}$ を等分割, 即ち $x_i = \frac{i}{n}, y_j = \frac{j}{n}$ ($i, j = 0, 1, \dots, n$) とする。このとき $\|\Delta_n\| = \frac{1}{n}$ である。小長方形領域は $\Delta_{ij} = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{j-1} \leq y \leq y_j\}$ 上の最小値は $f(x_{i-1}, y_{j-1})$, 最大値は $f(x_i, y_j)$ ので, $m_{ij} = \inf \{f(x, y) \mid (x, y) \in \Delta_{ij}\} = f(x_{i-1}, y_{j-1}) = \frac{i-1}{n} \frac{j-1}{n}$, $M_{ij} = \sup \{f(x, y) \mid (x, y) \in \Delta_{ij}\} = f(x_i, y_j) = \frac{i}{n} \frac{j}{n}$ となるので,

$$\begin{aligned} s(\Delta_n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} \Delta x_i \Delta y_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i-1}{n} \frac{j-1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i-1)(j-1) = \frac{1}{n^4} \left(\sum_{i=1}^n (i-1) \right) \left(\sum_{j=1}^n (j-1) \right) \\ &= \frac{1}{n^4} \frac{n(n-1)}{2} \frac{n(n-1)}{n} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\ S(\Delta_n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i}{n} \frac{j}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n ij = \frac{1}{n^4} \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^n j \right) \\ &= \frac{1}{n^4} \frac{n(n+1)}{2} \frac{n(n+1)}{n} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

となる。ここで $n \rightarrow \infty$ とすると, $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\Delta_n) = \frac{1}{4} = \lim_{n \rightarrow \infty} S(\Delta_n)$ となるので,

$$\iint_D xy dx dy = \frac{1}{4}$$

である。

演習問題 5.1 次の定積分を定義に基づいて計算せよ。

$$(1) \iint_D xy dx dy \quad (\text{ただし } D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\})$$

$$(2) \iint_D x^2 y^2 dx dy \quad (\text{ただし } D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\})$$