

## 解析学 I 問題解説 #6

河野

**演習問題 2.1** 上の関数が原点において連続でない事を示せ。また原点における偏導関数を求めよ

$z = f(x, y)$  が原点において連続であるとは  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0)$  が成立することである。原点で連続でないことを示すには、この極限が存在しないか、存在しても  $f(0, 0) = 0$  でないことを示せばよい。

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  とおいて極座標で考える。 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  と  $r \rightarrow 0$  は同値である。 $f(x, y) = \frac{r \cos \theta r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \cos \theta \sin \theta$  となるので極限値は  $\theta$  に依存する。たとえば  $\theta = 0$  のときは 0 であるが  $\theta = \frac{\pi}{4}$  のときは  $\frac{1}{2}$  である。2 变数の極限の定義よりこれは収束しない。よって  $f(x, y)$  は  $(0, 0)$  で連続ではない。偏導関数は

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h0}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{0k}{0^2 + k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0}{k} = 0\end{aligned}$$

である。

**演習問題 2.2** 演習問題 3.1 の関数は原点で全微分可能でない事を示せ。

$f(x, y)$  が  $(x, y)$  で全微分可能でとの定義は

$$\varepsilon(h, k) = \frac{f(x + h, y + k) - f(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)k}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

とおくとき  $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h, k) = 0$  が成立することである。

$(x, y) = (0, 0)$  のとき

$$\begin{aligned}\varepsilon(h, k) &= \frac{f(0 + h, 0 + k) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \\ &= \frac{\frac{hk}{h^2 + k^2} - 0 - 0h - 0k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{hk}{(h^2 + k^2)\sqrt{h^2 + k^2}}\end{aligned}$$

となる。 $h = r \cos \theta, k = r \sin \theta$  とおくと

$$\varepsilon(h, k) = \frac{r \cos \theta r \sin \theta}{((r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2) \sqrt{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2}} = \frac{\cos \theta \sin \theta}{r}$$

となる。 $(h, k) \rightarrow (0, 0)$  と  $r \rightarrow 0$  は同値でなので  $\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon(h, k) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\cos \theta \sin \theta}{r}$  となる。これは収束しないので  $f$  は  $(0, 0)$  において全微分可能ではない。

**演習問題 2.3** 次の関数の偏導関数を求めよ。

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| (1) $z = x^3 - 3xy + y^3$                        | (2) $z = (x^3 + y^4)^{100}$       |
| (3) $z = \frac{x - y}{2x + 3y}$                  | (4) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$        |
| (5) $e^{ax^2 + by^2}$                            | (6) $z = x \arctan \frac{x}{y}$   |
| (7) $z = xy \sin(x^2 + y^2)$                     | (8) $z = x^2 y^2 \log(x^3 + y^3)$ |
| (9) $z = xy \arcsin \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ | (10) $z = x^x y^y x^y y^x$        |

$x$  に関する偏導関数は、 $y$  を定数として  $x$  に関する 1 变数関数と見て微分すれば求まる。よって 1 变数関数の色々な定理を用いて計算することができる。ここでは結果のみ記しておく。

- (1)  $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = -3x + 3y^2$
- (2)  $\frac{\partial z}{\partial x} = 300(x^3 + y^4)^{99}x^2$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 400(x^3 + y^4)^{99}y^3$
- (3)  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{5y}{(2x + 3y)^2}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{5x}{(2x + 3y)^2}$
- (4)  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
- (5)  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2axe^{ax^2 + by^2}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 2bye^{ax^2 + by^2}$
- (6)  $\frac{\partial z}{\partial x} = \arctan \frac{x}{y} + \frac{xy}{x^2 + y^2}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^2}{x^2 + y^2}$
- (7)  $\frac{\partial z}{\partial x} = y \sin(x^2 + y^2) + 2x^2 y \cos(x^2 + y^2)$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = x \sin(x^2 + y^2) + 2xy^2 \cos(x^2 + y^2)$
- (8)  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^2 \log(x^3 + y^3) + \frac{3x^4 y^2}{x^3 + y^3}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^2 y \log(x^3 + y^3) + \frac{3x^2 y^4}{x^3 + y^3}$
- (9)  $\frac{\partial z}{\partial x} = y \arcsin \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = x \arcsin \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2}$
- (10)  $\frac{\partial z}{\partial x} = x^x (\log x + 1)y^x x^y y^x + x^x y^y x^{y-1} y^{x+1} + x^x y^y x^y y^x \log y$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = x^x y^y (\log y + 1)x^y y^x + x^x y^y x^{y+1} y^{x-1} + x^x y^y x^y y^x \log x$