

演習問題 1.10 次において P は Q の, 1) 必要十分条件, 2) 必要条件ではあるが十分条件ではない, 3) 十分条件ではあるが必要条件ではない, 4) 必要条件でも十分条件でもない, のいずれかであるか決定せよ。ここで x, y は実数とする。

- | | |
|---|---|
| (1) $P : x^2 = 1, Q : x = 1$ | (2) $P : xy > 0, Q : x > 0 \text{かつ} y > 0$ |
| (3) $P : xy > 0, Q : x > 0 \text{または} y > 0$ | (4) $P : xy = 0, Q : x = 0 \text{かつ} y = 0$ |
| (5) $P : xy = 0, Q : x = 0 \text{または} y = 0$ | (6) $P : xy = 0 \text{かつ} y = x + 1, Q : x = 0 \text{かつ} y = 1$ |
| (7) $P : x^2 + 2x - 1 = 0 \text{かつ} x > 0, Q : x = -1 + \sqrt{2}$ | |

(1) $Q \Rightarrow P$ は正しい(このことの証明は不要であろう)。 $P \Rightarrow Q$ は $x = -1$ という反例があるので正しくない。よって P は Q であるための必要条件である。

(2) $Q \Rightarrow P$ は正しい。 $P \Rightarrow Q$ は $x = -1$ かつ $y = -1$ という反例があるので正しくない。よって P は Q であるための必要条件である。

(3) $P \Rightarrow Q$ は $x = -1$ かつ $y = -1$ という反例があるので正しくない。 $Q \Rightarrow P$ は $x = 1$ かつ $y = -1$ という反例があるので正しくない。よって P は必要条件でも十分条件でもない。

(4) $Q \Rightarrow P$ は正しい。 $P \Rightarrow Q$ は $x = 0$ かつ $y = 1$ という反例があるので正しくない。よって P は必要条件である。

(5) 積の性質から P は Q の必要十分条件である。

(6) $Q \Rightarrow P$ は正しい。 $P \Rightarrow Q$ は $x = -1$ かつ $y = 0$ という反例があるので正しくない。よって P は必要条件である。

(7) $-1 + \sqrt{2} > 0$ かつ $(-1 + \sqrt{2})^2 + 2(-1 + \sqrt{2}) - 1 = 0$ なので $Q \Rightarrow P$ は正しい。 $x^2 + 2x - 1 = 0$ の必要十分条件は $x = -1 + \sqrt{2}$ または $x = -1 - \sqrt{2}$ である。このなかで正の数は $-1 + \sqrt{2}$ のみである。よって $P \Rightarrow Q$ は正しい。 P は必要十分条件である。

演習問題 1.11 次の連立方程式の解を求めよ。

- (1) $x(x^2 + y^2) = 0$ かつ $y(x^2 + y^2 - 1) = 0$
- (2) $x^3 - x + y = 0$ かつ $y^3 + x - y = 0$
- (3) $(y - 2x^2y)2^{-x^2-y^2} = 0$ かつ $(x - 2xy^2)2^{-x^2-y^2} = 0$

(1) $x(x^2 + y^2) = 0$ である必要十分条件は $x = 0$ または $x^2 + y^2 = 0$ である。 $x^2 + y^2 = 0$ である必要十分条件は $(x, y) = (0, 0)$ である。よって $x(x^2 + y^2) = 0$ である必要十分条件は $x = 0$ または $(x, y) = (0, 0)$ であるが、これは $x = 0$ と同値である。

\vee, \Leftrightarrow 等の記号を用いた方が分かりやすいかもしれない。上のことを記号を用いて書いておく。

$$\begin{aligned} x(x^2 + y^2) = 0 &\Leftrightarrow (x = 0) \vee (x^2 + y^2) = 0 \\ x^2 + y^2 = 0 &\Leftrightarrow (x, y) = (0, 0) \end{aligned}$$

なので

$$(x = 0) \vee (x^2 + y^2) = 0 \Leftrightarrow (x = 0) \vee (x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow x = 0$$

となる。

よって与えられた連立方程式は連立方程式

$$(x = 0) \wedge (x^2 + y^2 - 1 = 0)$$

と同値である。 $x = 0$ を 2 番目の式に代入すると $y(y^2 - 1) = 0$ となり、 $y = 0$ または $y = 1$ または $y = -1$ となる。

これらの解を最初に式に代入すると式は成立する。よって求める解は $(x, y) = (0, 0)$ または $(x, y) = (0, 1)$ または $(x, y) = (0, -1)$ である。

(2) $x^3 - x + y = 0$ を 1 式、 $y^3 + x - y = 0$ を 2 式とする。1 式と 2 式を加えると $x^3 + y^3 = 0$ を得る。 $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2) = 0$ なので

$$x^3 + y^3 = 0 \iff (x + y = 0 \vee x^2 - xy + y^2 = 0)$$

が成立している。

$$x^2 - xy + y^2 = \left(x - \frac{1}{2}y\right)^2 + \frac{3}{4}y^2$$

なので

$$x^2 - xy + y^2 = 0 \iff \left(x - \frac{1}{2}y = 0 \wedge y = 0\right) \iff (x = 0 \wedge y = 0)$$

となる。よって

$$(x + y = 0 \vee x^2 - xy + y^2 = 0) \iff (x + y = 0 \vee (x, y) = (0, 0)) \iff x + y = 0$$

が成立するので

$$x^3 + y^3 = 0 \iff x + y = 0$$

が分かる。この式を 3 式とすると

$$1 \text{ 式かつ } 2 \text{ 式} \iff 1 \text{ 式かつ } 3 \text{ 式}$$

が成立するので、1 式と 3 式からなる連立方程式を解けばよいことが分かる。3 式を 1 式に代入することにより $x^3 - 2x = 0$ が得られる。 $x^3 - 2x = x(x^2 - 2) = x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) = 0$ なので $x = 0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$ となる。

これらの解を最初に式に代入すると式は成立する。よって解は $(x, y) = (0, 0), (\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ である。

(3) 指数関数は 0 になることはないので連立方程式は $y - 2x^2y = 0$ (1 式) かつ $x - 2xy^2 = 0$ (2 式) と考えることができる。

$$\begin{aligned} y - 2x^2y = y(1 - 2x^2) = 0 &\iff y = 0 \text{ または } 1 - 2x^2 = 0 \\ x - 2xy^2 = x(1 - 2y^2) = 0 &\iff x = 0 \text{ または } 1 - 2y^2 = 0 \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} 1 \text{ 式かつ } 2 \text{ 式} &\iff (1) x = 0 \text{ かつ } y = 0, \text{ または} \\ &\quad (2) x = 0 \text{ かつ } 1 - 2x^2 = 0, \text{ または} \\ &\quad (3) 1 - 2y^2 = 0 \text{ かつ } y = 0, \text{ または} \\ &\quad (4) 1 - 2y^2 = 0 \text{ かつ } 1 - 2x^2 = 0 \end{aligned}$$

が成立する。(1) のときは $(x, y) = (0, 0)$ になる。(2) のときは $x = 0$ を $1 - 2x^2 = 0$ を代入すると $1 = 0$ が成立する。これは矛盾なのでこのとき解は存在しない。(3) のとき $y = 0$ を $1 - 2y^2 = 0$ を代入すると $1 = 0$ が成立する。これは矛盾なのでこのとき解は存在しない。(4) のときは $1 - 2x^2 = 0$ より $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$, $1 - 2y^2 = 0$ より $y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ となる。

これらの解を最初に式に代入すると式は成立する。以上により

$$(x, y) = (0, 0), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

を得る。