

数学序論問題解説 #6

河野

演習問題 3.1 次の計算をせよ。

$$(1) (3+5i)+(4-7i)$$

$$(2) (2+3i)(3-4i)$$

$$(3) \frac{5+3i}{1+2i}$$

$$(4) \frac{1}{5-2i}$$

$$(1) 7-2i \quad (2) 18+i \quad (3) \frac{11}{5}-\frac{7}{5}i \quad (4) \frac{5}{29}+\frac{2}{29}i$$

演習問題 3.2 命題 3.2 を証明せよ。

$\alpha = a + bi$, $\alpha_1 = a_1 + b_1i$, $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ とおく。

(1) $\overline{\alpha} = a - bi = a + (-b)i$ なので, $\overline{\overline{\alpha}} = a - (-b)i = a + bi = \alpha$ となる。

(2) $\alpha_1 + \alpha_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$ なので

$$\begin{aligned}\overline{\alpha_1 + \alpha_2} &= \overline{(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i} \\ &= (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)i \\ &= a_1 - b_1i + a_2 - b_2i \\ &= \overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2}\end{aligned}$$

(3) $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$ なので

$$\overline{\alpha_1 \cdot \alpha_2} = \overline{(a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i} = (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

であるが、

$$\overline{\alpha_1} \cdot \overline{\alpha_2} = (a_1 - b_1i) \cdot (a_2 - b_2i) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

となるので $\overline{\alpha_1 \cdot \alpha_2} = \overline{\alpha_1} \cdot \overline{\alpha_2}$ が成立する。

(4)

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (a_2 b_1 - a_1 b_2)i}{a_2^2 + b_2^2}$$

なので

$$\overline{\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right)} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) - (a_2 b_1 - a_1 b_2)i}{a_2^2 + b_2^2}$$

となる。一方

$$\frac{\overline{\alpha_1}}{\overline{\alpha_2}} = \frac{a_1 - b_1i}{a_2 - b_2i} = \frac{(a_1 - b_1i)(a_2 + b_2i)}{(a_2 - b_2i)(a_2 + b_2i)} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) - (a_2 b_1 - a_1 b_2)i}{a_2^2 + b_2^2}$$

となるので

$$\overline{\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right)} = \frac{\overline{\alpha_1}}{\overline{\alpha_2}}$$

が成立する。

演習問題 3.3 次の問い合わせよ。

- (1) $\alpha = 0 \iff |\alpha| = 0$ を証明せよ。
- (2) $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha||\beta|$ を示せ。

(1) $\alpha = a_1 + a_2i$ とおくと

$$\alpha = 0 \iff a_1 = 0 \text{かつ} a_2 = 0 \iff a_1^2 + a_2^2 = 0 \iff |\alpha| = 0$$

となり成立する。

(2) $\alpha = a_1 + b_1i$, $\beta = a_2 + b_2i$ とおくと

$$\alpha \cdot \beta = (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$$

なので

$$\begin{aligned} |\alpha \cdot \beta|^2 &= (a_1a_2 - b_1b_2)^2 + (a_1b_2 + a_2b_1)^2 \\ &= a_1^2a_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 + b_1^2b_2^2 + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 - 2a_1b_2a_2b_1 + a_2^2b_1^2 \\ &= a_1^2(a_2^2 + b_2^2) + b_1^2(a_2^2 + b_2^2) \\ &= (a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2) \\ &= (|\alpha| |\beta|)^2 \end{aligned}$$

となる。 $|\alpha \cdot \beta| \geq 0$, $|\alpha| \geq 0$, $|\beta| \geq 0$ より $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha||\beta|$ となる。

演習問題 3.4 図 3.3 を参考にして定理 3.3 を証明せよ。

(1) O , β , $\alpha + \beta$ を頂点とする 3 角形を考える。ただし 3 角形がつぶれて 1 直線になっている場合も含むとする。この 3 角形の 3 辺の長さは $|\alpha|$, $|\beta|$, $|\alpha + \beta|$ なので三角不等式より

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

が成立する。

(2) O , α , β を頂点とする 3 角形を考える。ただし 3 角形がつぶれて 1 直線になっている場合も含むとする。この 3 角形の 3 辺の長さは $|\alpha|$, $|\beta|$, $|\alpha - \beta|$ なので三角不等式より

$$|\alpha| \leq |\alpha - \beta| + |\beta|$$

が成立する。移行すると (2) 式の成立が分かる。

ここで紹介した証明は幾何的(図形的)証明だが代数的証明も紹介しておこう。

$\alpha = a + ib$, $\beta = c + id$ とおくと $\alpha + \beta = (a + c) + i(b + d)$ なので

$$|\alpha + \beta|^2 = (a + c)^2 + (b + d)^2, \quad |\alpha|^2 = a^2 + b^2, \quad |\beta|^2 = c^2 + d^2$$

となっている。シュワルツの不等式 : $(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ を用いると

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= (a + c)^2 + (b + d)^2 = a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2 \\ &= a^2 + b^2 + 2(ac + bd) + c^2 + d^2 \\ &\leq |\alpha|^2 + 2\sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} + |\beta|^2 \\ &= |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 = (|\alpha| + |\beta|)^2 \end{aligned}$$

となる。 $|\alpha + \beta| \geq 0$ なので

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

を得る。証明した式において $\alpha \rightarrow \alpha - \beta$ という置き換えを行うと (2) の式が得られる。