

5 微分法

微分法の最初に数列及び関数の極限に簡単に申し復習しておく。

5.1 数列の極限

各自然数 n に対し, 数 a_n が定められているとき $\{a_n\}$ を無限数列という (以下単に数列という)。言い替えば数列とは自然数全体のなす集合 \mathbb{N} から実数全体のなす集合 \mathbb{R} への写像のことを数列と呼ぶ。

n を大きくしてゆくと, a_n がある一定の値 α に限りなく近づくとする。このとき数列 $\{a_n\}$ は α に収束する⁽¹⁾といい, α をその極限值という。このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

あるいは

$$a_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty)$$

と書く。 $\{a_n\}$ が収束しないとき, 発散するという。発散するとき, $n \rightarrow \infty$ のときの a_n の挙動は様々であるが, 特に $a_n \rightarrow \infty$ あるいは $a_n \rightarrow -\infty$ となるとき, $\pm\infty$ は数ではないが, 便宜的に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad \text{または} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

と書く。

例 5.1 (1) $a_n = \frac{1}{n}$ のとき, 即ち

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

となる数列を考える。 $n \rightarrow \infty$ としたとき, $\frac{1}{n}$ は 0 に近づく。即ち

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

が成立する。

(2) $a_n = n^2$ とおくと a_n は収束しないが,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

である。

⁽¹⁾これは直感的説明であり厳密な定義ではない。厳密には下記の「 ε - N 論法」と呼ばれる方法で定義される。この講義ではこの論法に深入りはしない。数列 a_n が次を満たすとき「数列 a_n は α に収束する」といい, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ と書く;
 $\forall \varepsilon (> 0) \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \quad n > N \implies |a_n - \alpha| < \varepsilon$ が成立する。

(3) $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ とおくと a_n は収束しない。また $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$ も成立しない。

(4) a を実数とする。 $a_n = a^n$ とおくと $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ の収束・発散は、指数関数の所で学んだように、 a の値によって異なり、次のようになっている。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} \infty & (\text{発散}) & a > 1 \\ 1 & & a = 1 \\ 0 & & -1 < a < 1 \\ \text{発散} & & a \leq -1 \end{cases}$$

定理 5.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (α, β は有限値) のとき

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (ka_n) = k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = k\alpha$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha \pm \beta$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha \beta$
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (ただし $\beta \neq 0$ とする。)

が成立する。

定理 5.2 (1)~(4) は直感的には明らかであろうが、きちんとした証明は、「 ε - N 論法」を用いてなされる必要がある。証明は星印付きの演習問題とする。

演習問題 *5.1 定理 5.2 を証明せよ。

この定理により、数列の各項がいくつかの代数的結合 (和・差・積) で表されるときは、その各々の極限值がわかれば容易にその極限值はもとまる。しかし (4) において、 $a_n, b_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) となる場合や、 a_n, b_n が $\pm\infty$ に発散する場合は $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ は形式的には $\frac{0}{0}$ や $\frac{\infty}{\infty}$ となり、値が定まらないように見える (実際には収束する場合も発散する場合もある)。このような場合を不定型という。微積分においては不定型の極限が大事なことが多い。

例 5.3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{n+2}$ をもとめよ。

分子、分母は $n \rightarrow \infty$ のとき ∞ になるが、それらの比自体は有限値に収束することがありうる。この場合も n が十分大きければ、 $n+2$ と n の比はほぼ 1、同様に $\sqrt{n^2+1}$ と $\sqrt{n^2} = n$ の比も同様、したがって $\frac{\sqrt{n^2+1}}{n+1} \doteq 1, \frac{\sqrt{n^2+1}}{n+1} \rightarrow 1$ となることが予想される。実際

$$\frac{\sqrt{n^2+1}}{n+2} = \frac{\sqrt{n^2+1} \times \frac{1}{n}}{(n+2) \times \frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}{1+\frac{2}{n}} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

すなわち

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{n+2} = 1$$

である。

ここで用いた方法を反省してみよう。分母において n は最も増大度が大きい項である。その項で分子および分母を割っても分数は変化せず、分母は収束する形に変形される。このとき分子が収束すれば、定理 5.2 の商の公式を用いることができる。

演習問題 5.2 次の極限值を求めよ。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3n-1} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{2n^2+n+1} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+3n+1}}{n+2} \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n-1}$$

これらの例・演習問題では分子・分母の増大度を比較的容易にくらべることができた。しかし一般には単純でない。よく分からない数列を知られた数列ではさむことにより数列の極限を求める方法が知られている。次の定理がそれである。

定理 5.4 [はさみうちの定理] 任意の自然数 n に対し

$$b_n \leq a_n \leq c_n$$

が成立しているとする。 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ のとき a_n も収束し、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

が成立する。

演習問題 *5.3 定理 5.4 を証明せよ。

例 5.5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ ($a > 0$) を示せ。

$N > a$ となる自然数 N を 1 つ選んで固定する。 $n > N$ とする。 $k > N$ のとき $\frac{a}{k} < \frac{a}{N}$ が成立することに注意すると

$$\begin{aligned} 0 < \frac{a^n}{n!} &= \frac{a}{1} \frac{a}{2} \cdots \frac{a}{N-1} \frac{a}{N} \cdots \frac{a}{n} \\ &< \frac{a}{1} \frac{a}{2} \cdots \frac{a}{N-1} \underbrace{\frac{a}{N} \frac{a}{N} \cdots \frac{a}{N}}_{n-N+1 \text{ 個}} = \frac{a}{1} \frac{a}{2} \cdots \frac{a}{N-1} \left(\frac{a}{N}\right)^{n-N+1} \end{aligned}$$

という不等式が成立する。ここで $b_n = 0$, $c_n = \frac{a}{1} \frac{a}{2} \cdots \frac{a}{N-1} \left(\frac{a}{N}\right)^{n-N+1}$ と定義し、これに

定理 5.4 を適用する。 $\frac{a}{N} < 1$ より $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{N}\right)^{n-N+1} = 0$ となる。よって $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ が得られる。 ■

この例は a^n ($a > 1$) の増大度より、 $n!$ の増大度の方がさらに大きいことを意味する。

演習問題 5.4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{2^n} = 0$ を示せ。

(ヒント) $a_n = \frac{n^3}{2^n}$ とする。 n を十分大きくすれば $\frac{1}{2} < r < 1$ となる適当な r を選んで $\frac{a_{n+1}}{a_n} < r$ とできる。

$\frac{\infty}{\infty}$ や $\frac{0}{0}$ の形の不定型の他の不定型の極限としては $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$ のように $\infty - \infty$ の形などもある。

例 5.6 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}$

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

(注, $\frac{\infty}{\infty}$ の形に変形してもとめた)

演習問題 5.5 次をもとめよ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - 2n)$

ここで指数関数の微分において重要な次の数列の極限を考える。

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

とすると $\{a_n\}$ は収束する (星印付の演習問題とする)。その極限値を e と定める。

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (1)$$

e は無理数であり,

$$e = 2.7182818 \dots$$

と近似されることが知られている。

演習問題 *5.6 「単調増加数列 $\{a_n\}$ の各項がすべてある定数 K より小であるならば数列は収束する」という定理は知られているものとする。次の順で数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ が収束することを示せ。

(1) 任意の自然数 n に対し $a_n \leq 3$ であることを示せ。

(2) a_n が単調増加, 即ち任意の自然数 n に対し $a_n \leq a_{n+1}$ が成立することを示せ。

自然対数の底 e は

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots \quad (2)$$

と無限級数で表されることを解析学 I で学ぶ。

数列 (1) は収束が非常に遅く, 数列 (2) は非常に早い。このことは演習問題 5.7 を解くことにより実感してほしい。

注: 無限級数

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

とは, 部分和, $S_0 = 1, S_1 = 1 + \frac{1}{1!}, S_2 = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}, \dots, S_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}, \dots$ で定まる数列 $\{S_n\}$ の極限値を意味する。

演習問題 5.7 電卓等を使って数列 (2) の部分 and を S_0 から S_{10} まで計算し, S_n がしたいに e に近づくことをたしかめよ。また $a_{10} = \left(1 + \frac{1}{10}\right)^{10}$, $a_{100} = \left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100}$, $a_{1000} = \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000}$ の値と比較せよ。

例 5.7 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e \quad (n \rightarrow \infty)$$

演習問題 5.8 次をもとめよ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$

5.2 関数の極限

変数 x が a に (a と異なる値をとりながら) 限りなく近づくとき, 関数 $f(x)$ の値がある数 A に限りなく近づくとする。このとき

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

と書き, $x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ は A に収束するという⁽¹⁾。また A を $x \rightarrow a$ としたときの $f(x)$ の極限值という。

$x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ の値が $\pm\infty$ となるとき $\pm\infty$ は数ではないが

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$$

と書くのは数列の場合と同様である。

変数 x が $x > a$ を満たしながら a に限りなく近づくとき, 関数 $f(x)$ の値がある数 A に限りなく近づくとする。このとき

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$$

と書き, $x \rightarrow a+0$ のとき $f(x)$ は A に収束するという。また A を $x \rightarrow a+0$ としたときの $f(x)$ の右側極限值という。

変数 x が $x < a$ を満たしながら a に限りなく近づくとき, 関数 $f(x)$ の値がある数 A に限りなく近づくとする。このとき

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A$$

と書き, $x \rightarrow a-0$ のとき $f(x)$ は A に収束するという。また A を $x \rightarrow a-0$ としたときの $f(x)$ の左側極限值という。 $a = 0$ のとき $x \rightarrow 0+0$ を $x \rightarrow +0$ と $x \rightarrow 0-0$ を $x \rightarrow -0$ と略記することもある。

変数 x が限りなく大きくなる時, 関数 $f(x)$ の値がある数 A に限りなく近づくとする。このとき

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

⁽¹⁾これは直感的説明であり厳密な定義ではない。厳密には下記の「 ε - δ 論法」と呼ばれる方法で定義される。この講義ではこの論法に深入りはしない。関数 f が次を満たすとき「 $x \rightarrow a$ のとき $f(x)$ は A に収束する」といい、 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ と書く; $\forall \varepsilon (> 0) \in \mathbb{R} \exists \delta (> 0) \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} \ 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$ が成立する。

と書き, $x \rightarrow \infty$ のとき $f(x)$ は A に収束するという⁽²⁾。

変数 x が限りなく小さくなる時, 関数 $f(x)$ の値がある数 A に限りなく近づくとする。このとき

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

と書き, $x \rightarrow -\infty$ のとき $f(x)$ は A に収束するという。

例 5.8 関数の極限に関するいくつかの例:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3) = 4 \qquad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3 \qquad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} 2^x = \infty$$

数列の場合と同様に次の定理が成立する。

定理 5.9 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ とする (A, B は有限値)。

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} (kf(x)) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = kA$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \pm B$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = AB$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B} \quad (\text{ただし } B \neq 0 \text{ とする})$$

証明は数列の場合と同様にきちんと実行するには「 ε - δ 論法」が必要になる。数列のときと同様に証明は星印付きの演習問題にする。

演習問題 *5.9 定理 5.9 を証明せよ。

定理 5.10 [はさみうちの定理] a のまわりの任意の x に対し

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

が成立しているとする。 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A$ のとき, $f(x)$ も収束し, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ が成立する。

演習問題 *5.10 定理 5.10 を証明せよ。

$x \rightarrow a$ のとき $f(x), g(x) \rightarrow 0$ あるいは $f(x), g(x) \rightarrow \pm\infty$ となる場合の $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ を数列の場合と同様に不定型と呼ぶ。数列の場合と同様に形式的には $\frac{0}{0}$ あるいは $\frac{\infty}{\infty}$ で不定であるが, 有限値に収束している場合もある。例 5.8(3) はその例になっている。ここで関数の極限に関しても数

⁽²⁾これは直感的説明であり厳密な定義ではない。厳密には次に述べる「 ε - N 論法」と呼ばれる方法で定義される。この講義ではこの論法に深入りはしない。関数 f が次を満たすとき「 $x \rightarrow \infty$ のとき $f(x)$ は A に収束する」といい, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ と書く; $\forall \varepsilon (> 0) \in \mathbb{R} \exists N (> 0) \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R} \ x > N \implies |f(x) - A| < \varepsilon$ が成立する。

列の場合と同様の演習を行う必要があるが、微分の所で扱う「ロピタルの定理」という強力な道具があるので、演習はそのときに行う。

最後に三角関数と指数関数の微分の基礎となる 2 つの極限值を紹介しておく。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (\text{変数 } x \text{ はラジアンとする}) \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad (2)$$




図 5.1

演習問題 5.11 (1) の成立を仮定して次を示せ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

演習問題 5.12

(1) 図 5.1 を参考にして $x > 0$ のとき、 $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1$ を示せ。

(2) $x = -t$ とおくことにより $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{\sin x}{x} = 1$ を示せ。

(1), (2) より $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ が示される。

(3) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$ を示せ。

(4) $\lim_{t \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$ を示せ。

(5) $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$ を示せ。

(6) $x = \log(1+u)$ とおくことにより $\frac{e^x - 1}{x} = 1$ を示せ。