

注意：・答えは日本語として理解可能なものである事。数式に対し説明が必要な場合に、数式のみで説明がないときには仮に数式が正しくても満点とならないことがある。

・採点は減点法を採用する。つまり間違いの内容によっては白紙答案より低い点数になる場合がある。careless miss でそのような事はないが、「分からなくても適当に何か書いておけ」という姿勢で回答するとそうなることがある。

・内容を理解せずに丸暗記していると判断されたものに対して大きく減点することがあるので注意すること。

・在籍番号欄について：2年生以上は10桁の在籍番号を書く事。1年生は出席番号(多くは2桁)でよい。

1 $y = a^{x^2+x} \log(x^3 + 3x)$ を微分せよ。 $(a^x)' = a^x \log a$, $(\log x)' = \frac{1}{x}$ 等の諸公式を用いてよい。

2 関数 $y = f(x)$ に対し $x = a + h$, $\varepsilon(h) = \frac{f(a+h) - (A + Bh + Ch^2)}{h^2}$ とおく。 $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ が成立するとき $g(h) = A + Bh + Ch^2$ を $x = a$ で $y = f(x) = f(a+h)$ を一番よく近似する2次式という。
 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ とする。 $x = 0$ で $y = f(x) = f(0+h)$ を一番よく近似する2次式を求めよ。

裏にも問題あり。別紙にも問題あり

学 科		在 番 籍 号		氏 名	
--------	--	------------------	--	--------	--

3 テーラーの定理とは

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n)}(a+\theta(x-a))}{n!} (x-a)^n$$

を満たす θ ($0 < \theta < 1$) が存在する, というものである。 $R_n = \frac{f^{(n)}(a+\theta(x-a))}{n!} (x-a)^n$ を剰余項と呼ぶ。

剰余項 R_n を切り捨て $f(x)$ の近似値として, $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ を採用することにより近似計算をすることができる。このとき誤差の絶対値は $|R_n|$ である。

(1) これを用いて $e^{-\frac{1}{3}}$ の近似計算を行う。 $f(x) = e^x, a = 0, n = 3$ として近似値を計算せよ。

(2) $f(x) = e^x, a = 0$ として $e^{-\frac{1}{3}}$ の近似計算を行いたい。ただし, 誤差の絶対値が 10^{-4} より小さくなるように n を決定し, その n を用いて近似値を計算せよ。

4 $y = f(x) = \log(x + 3)$ を $x = 0$ でテーラー展開することを考える。次の問いに答えながら、テーラー展開を求めよ。

(1) $f'(x)$ および $f''(x)$, $f^{(3)}(x)$, $f^{(4)}(x)$ を求めよ。

(2) 自然数 n に対し $f^{(n)}(x)$ を予想し、それが正しいことを数学的帰納法で証明せよ。

(3) $y = f(x) = \log(x + 3)$ を $x = 0$ でテーラー展開せよ。

裏にも問題あり。別紙にも問題あり

学 科		在 番 籍 号		氏 名	
--------	--	------------------	--	--------	--

5 次の様にパラメータ表示された曲線の概形を書け。

$$x = x(t) = t^3 - t, \quad y = y(t) = 1 - t^2$$

6 授業についての感想，数学について思う事などがあれば記せ (10)。